Пептиди срещу бръчки

Прогресът в естетичната медицина не спира. Популярният ботокс днес може да бъде „оптимизиран" с комбинация от пептиди.



Поставянето на ботулинов токсин от дерматолог за блокиране на мимическите бръчки е широко разпространена естетическа услуга, а в САЩ е най-често използваната процедура. Ефектът продължава от 3 до 6 месеца, но вече се използват субстанции, които удължават действието на ботокса. Става дума за три олигопептида – пентапептид-3, хексапептид и ацетилглутамилхептапептид-1. Те представляват особени белтъчни молекули, които имат способността да понижават освобождаването на ацетилхолин – виновник за мимическите бръчки.

Освен че удължават действието на ботулиновия токсин, тези пептиди могат и да го заместят. Тези, които се страхуват да не получат прекалено неподвижно изражение на лицето, могат да постигнат лека релаксация на мимическите бръчки чрез инжектиране на пептидите в определени точки по челото, зоната между веждите и около очите.

Комбинацията от трите пептида е известна като BONTA 568.



Съветите на дерматолога

Д-р Слава Божинова от Jewel skin clinic:

▶ **За да се постигне задоволителен резултат,** комплексът трябва да бъде инжектиран неколкократно в рамките на един месец.

▶ **Важно е да се знае,** че пептидите се разрушават от висока температура. Ето защо след подобно третиране трябва да се избягват сауна, хамам и пряка слънчева светлина.

▶ **Приложението на тези пептиди** не се допуска при пациенти, които приемат кортикостероиди или са на имунодепресивна терапия. При автоимунни заболявания, захарен диабет, остър ставен ревматизъм, ендокардит и често повтарящи се ангини процедурата също е неподходяща.